

Quick Bayt®

USO VETERINÁRIO

Grânulos para espalhamento ou pincelagem.

Insecticida para um controlo eficaz das moscas nas explorações animais.

Composição:

| | |
|--|---------------|
| Imidaclopride (principio activo) | 0,50% (p/p) |
| 9-tricosene (atractivo) | 0,10% (p/p) |
| Aroma de queijo concentrado (atractivo) .. | 0,25% (p/p) |
| Benzoato denatónio (amargante) | 0,01% (p/p) |
| Excipientes q.b.p. | 100,00% (p/p) |

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Precauções especiais :

Usar somente de acordo com as instruções.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo a dos animais.

Manter o produto dentro da embalagem original.

Evitar o contacto com a pele, olhos ou boca.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Lavar bem as mãos com água e sabão após a utilização.

Em caso de contacto accidental com os olhos, lavar bem com água corrente.

Em caso de contacto accidental com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Se os sintomas cutâneos ou oculares persistirem, ou se o produto for ingerido acidentalmente, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o rótulo do produto.

O produto não utilizado ou os seus resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos nacionais.

Não contaminar cursos ou outras fontes de água.

Perigoso para as abelhas e aves.

Antídoto e tratamento de emergência :

Não se conhece antídoto específico.

No caso de ingestão oral acidental a administração de carvão activado pode ser benéfica.

Em caso de acidente contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) – tel.: 808 250 143

Modo de emprego :

Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente respeitar as instruções de utilização.

Quick Bayt é um produto pronto a usar e pode ser aplicado na forma sólida ou em pasta após diluição em água.

Aplicação em pasta :

Diluir o conteúdo de uma embalagem de 50 g em 35 ml de água tépida.

Dissolver completamente e deixar repousar durante 15 minutos, tempo necessário para que a pasta atinja a consistência desejada.

Aplicar esta pasta com o auxílio de um pincel nos locais mais frequentados pelas moscas (paredes, parapeitos, traves de suporte, etc).

A dose de 50 g é suficiente para o tratamento de uma área de 25 m².

Aplicação sólida

Distribuir os grânulos de Quick Bayt em superfícies lisas mantendo pequenos intervalos entre as partículas. A dose de 50 g é suficiente para o tratamento de uma área de 25 m².

Fabricado por:

Denka International B.V.

3771 NG Barneveld

Holanda

RIM:

Bayer CropScience (Portugal)

Produtos para Agricultura Lda.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 CARNAXIDE

Tel: 21 417 21 21

AV nº 14 / 2002 / DGV